

Nadelstichverletzung



Erstmaßnahmen

1. Wunde bluten lassen, Fremdmaterial aus dem Stichkanal entfernen.
 2. Desinfektion der Wunde. Desinfektionsdauer: >10 Min.
Alle Händedesinfektionsmittel des UKW.
 3. Stationsarzt oder Dienstarzt informieren. Blutabnahme bei Indexpatienten veranlassen (HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV).
 4. Verletzung im Verbandsbuch dokumentieren.
- 

Umgehende Vorstellung beim D-Arzt ZOM / Chirurgische Notaufnahme

1. **Bei HIV-Kontakt erst** Vorstellung Medizinische Notfallambulanz der Med II zur Entscheidung über Medikamentengabe möglichst innerhalb von 2-4 h (43961)
 2. Ggf. Wundversorgung und Blutentnahme beim verletzten Mitarbeiter (Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV)
 3. Überprüfung Impfstatus Hepatitis B
 4. Ggf. Rücksprache mit der Medizinischen Notfallambulanz (43961) oder mit der virologischen Rufbereitschaft (201-1)
- 

Am nächsten Werktag telefonische Kontaktaufnahme Betriebsarzt zur Terminvereinbarung Haus D4, 18-82472

1. Besprechung der Laborbefunde
2. Festlegung des weiteren Vorgehens bzgl. Impfungen und Nachuntersuchungsintervallen (6, 12 und 24 Wochen)