

Nachbehandlungsschema

11/2020

Stabilisierung der Patella (mediale Raffung und MPFL-Plastik)

Zeitpunkt	Therapie	Bewegung / Belastung / Hilfsmittel
1. Phase: Woche 1 + 2 postoperativ	<ul style="list-style-type: none"> ○ Thromboseprophylaxe ○ Kryotherapie ○ in die Streckung arbeiten ○ Propriozeptive Neuromuskuläre Faszilisation <p>Ziel: Mobilisation + Schwellungsreduktion</p>	<p>Bewegungslimitierung Ex/Flex 0/0/60°</p> <p>Teilbelastung an UAGSt (20 kg)</p> <p>Mecronschiene für Woche 1+2 (für 3 Wochen nachts)</p>
2. Phase: Wochen 3-6	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aktive Extension gegen Eigengewicht des Beines ○ Aufdehnung des Tractus iliotibialis ○ Aufdehnung des M. rectus femoris ○ Auftrainieren des M. vastus medialis ○ Isometrisches Quadrizepstraining <p>Ziel: Kräftigung, Verbesserung der intramuskulären Koordination</p>	<p>Medi PT Control Ex/Flex 0/0/90°</p> <p>Vollbelastung</p> <p>Bewegungslimitierung ExFlex 0/0/90° bis Woche 5</p>
3. Phase: Ab 7. Woche - Ende 3. Monat	<p>Beginn mit Propriozeptionstraining</p> <p>Sport: (Nordic-) Walking, Schwimmen (noch kein Brustschwimmen)</p> <p>Beginn mit Ergometertraining, sobald Flexion >100°, Trittfrequenz > 90 U/Min.</p> <p>Vermeidung der tiefen, belastenden Hocke</p> <p>Ziel: Erlangung der freien Beweglichkeit, Kräftigung</p>	<p>PT Control nur noch für längere Wegstrecken</p>
4. Phase: Monate 4-6	<p>Krankengymnastik am Gerät</p> <p>Muskelaufbau in Eigenregie (z.B. Fitneßstudio)</p> <p>Sport: Schwimmen, Fahrradfahren</p>	
Ab 6 Monate	<p>Beginn mit Joggen (sukzessive, adaptiert)</p> <p>Sportartspezifisches Training ohne Gegnerkontakt</p>	
Ab ca. 8-12 Monate	<p>Wiederaufnahme des sportlichen Wettbewerbes (Rotationssportarten), zuvor ggf. Return-to-Play Testung</p>	

Kontrolltermine: 14 Tage postoperativ Fädenentfernung
6 Wochen postoperativ
12 Wochen postoperativ
6 und 12 Monate postoperativ

