



Aktuelle Resistenzanteile empfohlener Antibiotika zur kalkulierten Therapie der ambulant erworbenen unkomplizierten Zystitis (deutschlandweit ohne Region Nordwest)

Antibiotikum/ Antibiotikaklasse		Unkomplizierte HWI			
		Nicht-rezidivierende HWI		Rezidivierende HWI	
		Resistenzanteil	95% KI	Resistenzanteil	95% KI
Erste Wahl *	Fosfomycin	0,8 %	0,3 – 1,8	0,7 %	0,2 - 2,1
	Nitrofurantoin	0,1 %	0,0 - 0,8	0,9 %	0,3 - 2,2
	Nitroxolin	0,6 %	0,2 – 1,8	1,0 %	0,4 - 3,0
	Pivmecillinam	5,9 %	4,3 – 8,1	5,6 %	3,7 - 8,3
	Trimethoprim	14,1 %	11,7 – 16,8	24,0 %	20,3 – 28,2
Zweite Wahl *	Cefpodoxim	4,0 %	2,6 – 6,1	8,6 %	6,0 - 12,3
	Ciprofloxacin	6,7 %	5,1 – 8,8	13,0 %	10,2 – 16,4
	Cotrimoxazol	11,5 %	9,4 - 14,1	22,0 %	18,5 - 26,1
	Levofloxacin	7,3 %	5,5 – 9,6	12,5 %	9,5 – 16,3
	Norfloxacin	8,2 %	5,1 - 12,9	11,2 %	6,4 - 19,0
	Ofloxacin	9,5 %	5,3 - 16,6	4,5 %	1,3 - 15,1

- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum bedingt als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- NA keine Daten

*Entsprechend Leitlinienprogramm DGU: Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Langversion 1.1-2, 2017 AWMF Registernummer: 043/044