



Aktuelle Resistenzanteile empfohlener Antibiotika zur kalkulierten Therapie der ambulant erworbenen unkomplizierten Zystitis (Region Nordost)

	Antibiotikum/ Antibiotikaklasse	Unkomplizierte HWI			
		Nicht-rezidivierende HWI		Rezidivierende HWI	
		Resistenzanteil	95% KI	Resistenzanteil	95% KI
Erste Wahl *	Fosfomycin	0,0 %	0,0 - 1,9	1,0 %	0,2 - 5,4
	Nitrofurantoin	0,0 %	0,0 - 1,9	0,0 %	0,0 - 3,7
	Nitroxolin	1,9 %	0,5 - 6,8	2,3 %	0,4 - 11,8
	Pivmecillinam	4,5 %	1,8 - 11,0	12,5 %	6,2 - 23,6
	Trimethoprim	10,2 %	6,7 - 15,2	26,7 %	19,1 - 36,1
Zweite Wahl *	Cefpodoxim	3,3 %	1,5 - 7,0	11,2 %	6,4 - 19,0
	Ciprofloxacin	7,1 %	4,3 - 11,6	11,9 %	6,9 - 19,6
	Cotrimoxazol	9,6 %	6,3 - 14,6	24,8 %	17,4 - 34,0
	Levofloxacin	6,7 %	3,9 - 11,1	11,9 %	6,9 - 19,6
	Norfloxacin	7,6 %	3,9 - 14,3	2,3 %	0,4 - 11,8
	Ofloxacin	9,5 %	5,3 - 16,6	4,5 %	1,3 - 15,1

Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteil <5 %)

Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteil <5 %)

Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)

Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)

Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)

Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)

Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

Antibiotikum bedingt als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

NA keine Daten

*Entsprechend Leitlinienprogramm DGU: Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Langversion 1.1-2, 2017 AWMF Registernummer: 043/044