



Aktuelle Resistenzanteile empfohlener Antibiotika zur kalkulierten Therapie der ambulant erworbenen unkomplizierten Zystitis (Region Südwest)

Antibiotikum/ Antibiotikaklasse		Unkomplizierte HWI			
		Nicht-rezidivierende HWI		Rezidivierende HWI	
		Resistenzanteil	95% KI	Resistenzanteil	95% KI
Erste Wahl *	Fosfomycin	0,7 %	0,1 - 4,1	1,0 %	0,2 – 5,6
	Nitrofurantoin	0,7 %	0,1 - 4,0	2,0 %	0,6 – 7,1
	Nitroxolin	0,0 %	0,0 – 35,4	0,0 %	0,0 – 24,2
	Pivmecillinam	2,9 %	1,1 - 7,3	2,0 %	0,6 – 7,1
	Trimethoprim	14,7 %	9,7 – 21,6	27,6 %	19,7 – 37,1
Zweite Wahl *	Cefpodoxim	0,0 %	0,0 – 24,2	15,4 %	4,3 – 42,2
	Ciprofloxacin	5,1 %	2,5 – 10,2	12,2 %	7,1 – 20,2
	Cotrimoxazol	13,1 %	8,5 – 19,8	24,7 %	17,2 – 34,2
	Levofloxacin	5,1 %	2,5 – 10,2	10,2 %	5,6 - 17,8
	Norfloxacin	NA	–	NA	–
	Ofloxacin	NA	–	NA	–

- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum bedingt als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- NA keine Daten

*Entsprechend Leitlinienprogramm DGU: Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Langversion 1.1-2, 2017 AWMF Registernummer: 043/044